



Pregled proizvoda









Enteralna prehrana

Oralni nutritivni pripravci












Svi oralni nutritivni pripravci predstavljeni u ovom materijalu su prikladni za bolesti i stanja navedena prema indikacijama; za bolesnike koji su u riziku od malnutricije i one bolesnike koji ne mogu redovnom prehranom zadovoljiti energetske i nutritivne potrebe.




1. Osnovna i dopunska lista lijekova (HZZO)
2. SARC-F: From Malmstrom TK, Morley JE. SARC-F: a simple questionnaire to rapidly diagnose sarcopenia. J. Am Med Dir Assoc 2013; 14:531; NRS 2002: Kondrup J et al. (2003) ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition Screening 2002. clin Nutr; 22:415-421; SPPB test.

	STANDARDNI ORALNI PRIPRAVCI				BOLEST SPECIFIČNI ORALNI PRIPRAVCI									
	 Fresubin ENERGY Drink 300 kcal 1,5 kcal/ml 11,2g Proteina	 Fresubin PROTEIN ENERGY Drink 300 kcal 1,5 kcal/ml 20g Proteina	 Fresubin 2 KCAL Drink 400 kcal 2,0 kcal/ml 20g Proteina	 Fresubin 2 KCAL FIBRE Drink 400 kcal 2,0 kcal/ml 20g Proteina	 Fresubin RENAL 400 kcal 2,0 kcal/ml 6g Proteina	 Fresubin HEPA Drink 260 kcal 1,3 kcal/ml 8g Proteina	 Fresubin 2 kcal Crème 250 kcal 2,0 kcal/ml 12,5g Proteina	 Fresubin DB Crème 188 kcal 1,5 kcal/ml 9,4g Proteina						
Karakteristike	1,5 kcal/ml		2 kcal/ml		Bubrežna insuficijencija	Jetrena insuficijencija	Disfagija	Disfagija						
	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Visokokalorijski ● Ne sadrži vlakna** 		<ul style="list-style-type: none"> ▲ Visokokalorijski ▲ Visokoproteinski ● Ne sadrži vlakna** 		<ul style="list-style-type: none"> ▲ Visokokalorijski ▲ Visokoproteinski ● Ne sadrži vlakna 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Visokokalorijski ● Sadrži MCT ● Sadrži vlakna 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Visoko-proteinski ● Visok udio aminokiselina razgranatih lanaca ▼ Nizak udio aromatskih aminokiselina i metionina ● Sadrži MCT ● Sadrži vlakna 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Visokokalorijski ▲ Visokoproteinski ● Kremaste konzistencije ● Ne sadrži vlakna** 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Visokokalorijski ▲ Visokoproteinski ● Sadrži sporo oslobađajuće ugljikohidrate ● Sadrži MCT ▼ Nizak glikemijski indeks ● Sadrži vlakna ● Kremaste konzistencije 					
Smjernica¹	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indikacija: liječenje bolesnika s pothranjenošću ■ Preporuka za primjenu: bolnički specijalist ■ Nalaz: obavezno navesti tjelesnu težinu bolesnika i jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom enteralne nutritivne potpore ■ Nastavak primjene: izabrani doktor medicine svaka 3 mjeseca 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Indikacija: liječenje bolesnika s pothranjenošću ■ Preporuka za primjenu: bolnički specijalist ■ Nalaz: obavezno navesti tjelesnu težinu bolesnika i jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom enteralne nutritivne potpore ■ Nastavak primjene: izabrani doktor medicine svaka 3 mjeseca 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Indikacija: liječenje proteinsko-energetske pothranjenosti u bolesnika s renalnom insuficijencijom (KBB stadij 3-5) koji nisu na dijalizi ■ Preporuka za primjenu: specijalist nefrolog i/ili urolog i/ili endokrinolog ■ Nalaz: obavezno jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom enteralne nutritivne potpore ■ Nastavak primjene: specijalist nefrolog i/ili urolog i/ili endokrinolog svakih 6 mjeseci 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indikacija: liječenje bolesnika s kroničnim zatajenjem jetre ■ Preporuka za primjenu: specijalist gastroenterolog ■ Nalaz: obavezno navesti tjelesnu težinu bolesnika i jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom enteralne nutritivne potpore ■ Nastavak primjene: specijalist gastroenterolog svakih 6 mjeseci 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indikacija: za bolesnike s disfagijom ■ Preporuka za primjenu: bolnički specijalist ■ Nalaz: obavezno jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom enteralne nutritivne potpore ■ Nastavak primjene: bolnički specijalist svakih 6 mjeseci 							
Razlozi za primjenu enteralne prehrane^{1,2}	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 5% u mjesec dana ■ Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 10% u tri mjeseca ■ NRS 2002 ≥ 3 ■ BMI < 20,5 ■ Zbog bolesti se ne mogu normalnim putem zadovoljiti energetske i nutritivne potrebe 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 5% u mjesec dana ■ Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 10% u tri mjeseca ■ NRS 2002 ≥ 3 ■ BMI < 20,5 ■ Zbog bolesti se ne mogu normalnim putem zadovoljiti energetske i nutritivne potrebe 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 5% u mjesec dana ■ Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 10% u tri mjeseca ■ NRS 2002 ≥ 3 ■ BMI < 20,5 ■ Zbog bolesti se ne mogu normalnim putem zadovoljiti energetske i nutritivne potrebe 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 5% u mjesec dana ■ Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 10% u tri mjeseca ■ NRS 2002 ≥ 3 ■ BMI < 20,5 ■ Zbog bolesti se ne mogu normalnim putem zadovoljiti energetske i nutritivne potrebe 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Disfagija ■ Poremećaj gutanja ■ Rizik od aspiracije 							
	Bez laktoze i glutena		Bez laktoze i glutena		Bez laktoze i glutena	Bez laktoze i glutena	Bez laktoze, purina i kolesterola	Bez laktoze i glutena						
Okusi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanilija ■ Cappuccino ■ Jagoda 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Crni ribizl ■ Tropsko voće ■ Čokolada 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanilija ■ Čokolada ■ Lješnjak 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tropsko voće ■ Divlja jagoda 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanilija ■ Šumsko voće 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Marellica/breskva ■ Neutral 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Čokolada ■ Cappuccino 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Limun 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanilija ■ Cappuccino 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cappuccino 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanilija ■ Čokolada ■ Cappuccino 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Divlja jagoda ■ Praline 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vanilija ■ Cappuccino 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Praline ■ Divlja jagoda
Pakiranje	200 ml	200 ml	200 ml	200 ml	200 ml	200 ml	125 g	125 g						
Doziranje PP[*]	1000 ml - 1400 ml	800 ml - 1000 ml	800 ml - 1000 ml	800 ml - 1000 ml	≥ 1000 ml	1400 ml - 1600 ml	875 g - 1000 g	1000 g						
Doziranje NP^{**}	400 ml - 600 ml	400 ml - 600 ml	200 ml - 400 ml	200 ml - 400 ml	400 ml - 600 ml	400 ml - 600 ml	375 g - 500 g	375 g - 500 g						
Napomena	Nije pogodno za djecu mlađu od 3 godine. Primjenjivati oprezno kod djece mlađe od 6 godina. **1g vlakana u pripravku okusa čokolade.		Nije pogodno za djecu mlađu od 3 godine. Primjenjivati oprezno kod djece mlađe od 6 godina.		Nije pogodno za djecu mlađu od 3 godine. Primjenjivati oprezno kod djece mlađe od 6 godina.		Nije pogodno za djecu mlađu od 3 godine. Primjenjivati oprezno kod djece mlađe od 6 godina. **0,38g vlakana u pripravku okusa čokolade.							
	NA OSNOVNOJ LISTI HZZO-a		NA OSNOVNOJ LISTI HZZO-a		NA OSNOVNOJ LISTI HZZO-a		NA OSNOVNOJ LISTI HZZO-a							

^{*} Potpuna prehrana
^{**} Nadopuna prehrani








	BOLEST SPECIFIČNI ORALNI PRIPRAVCI			BOLEST SPECIFIČNI ORALNI PRIPRAVCI		BOLEST SPECIFIČNI ORALNI PRIPRAVCI		
	 Diben Drink 300 kcal 1,5 kcal/ml 15g Proteina	 Supportan Drink 300 kcal 1,5 kcal/ml 20g Proteina	 Fresubin 3.2 KCAL Drink 400 kcal 3,2 kcal/ml 20g Proteina	 ProvideXtra Drink 300 kcal 1,5 kcal/ml 8g Proteina	 Survived OPD 1.5 KCAL Drink 300 kcal 1,5 kcal/ml 15g Proteina	 Frebini ENERGY Drink 300 kcal 1,5 kcal/ml 7,6g Proteina	 Frebini ENERGY FIBRE Drink 300 kcal 1,5 kcal/ml 7,6g Proteina	 Thick & Easy
Karakteristike	Dijabetes ▲ Visokokalorijski ▲ Visokoproteinski ▲ Sadrži MCT ▲ Visok udio MUFA ▼ Nizak glikemijski indeks ○ Sadrži sporo oslobađajuće ugljikohidrate + Sadrži vlakna	Onkologija ▲ Visokokalorijski ▲ Visokoproteinski + Bogat EPA-om + Sadrži MCT + Sadrži vlakna ▼ Nizak udio masti	Sarkopenija ▲ Visokokalorijski ▲ Visokoproteinski ▲ Visoki udio vitamina D ₃ + Mali volumen + Jedinstvena kombinacija kolagen hidrolizata i mliječnih proteina	Malapsorpcija ▲ Visokokalorijski + Sadrži hidrolizirane proteine iz povrća - Ne sadrži masti - Ne sadrži proteine iz mlijeka i soje - Ne sadrži vlakna	Malapsorpcija ▲ Visokokalorijski + Visok udio hidroliziranih proteina sirutke + Visok udio MCT-a - Ne sadrži vlakna	Pedijatrija ▲ Visokokalorijski + Sadrži MCT + Sadrži taurin, karnitin i inozitol - Ne sadrži vlakna	Pedijatrija ▲ Visokokalorijski + Sadrži MCT + Sadrži taurin, karnitin i inozitol + Sadrži vlakna	Disfagija + Sadrži modificirani kukuruzni škrob + Sadrži maltodekstrin
Smjernica¹	■ Indikacija: liječenje pothranjenosti bolesnika s dijabetesom ■ Preporuka za primjenu: specijalist endokrinolog ■ Nalaz: obavezno navesti tjelesnu težinu bolesnika i jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom enteralne nutritivne potpore ■ Nastavak primjene: specijalist endokrinolog svakih 6 mjeseci	■ Indikacija: liječenje onkoloških bolesnika s tumorskom kaheksijom ■ Preporuka za primjenu: bolnički specijalist koji sudjeluje u onkološkom liječenju ■ Nalaz: obavezno navesti tjelesnu težinu bolesnika i jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom enteralne nutritivne potpore ■ Nastavak primjene: bolnički specijalist svakih 6 mjeseci	■ Indikacija: liječenje bolesnika s gubitkom mase, snage i funkcije mišića ■ Preporuka za primjenu: bolnički specijalist ■ Nalaz: pokretni bolesnici - procjena funkcionalne sposobnosti bolesnika korištenjem jednostavnih validiranih testova; nepokretni bolesnici - dovoljna je klinička procjena ■ Nastavak primjene: bolnički specijalist svakih 6 mjeseci	■ Za preoperativnu primjenu	■ Indikacija: liječenje bolesnika s malapsorpcijskim sindromom, teškim oblicima Crohnove bolesti, sindromom kratkog crijeva, teškom insuficijencijom funkcije gušterače i jetre, enteropatijama te svim oblicima zatajenja crijevne funkcije ■ Preporuka za primjenu: bolnički specijalist ■ Nalaz: obavezno navesti tjelesnu težinu bolesnika i jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom enteralne nutritivne potpore ■ Nastavak primjene: bolnički specijalist svakih 6 mjeseci	■ Indikacija: za djecu stariju od 1 godine s povećanim energijskim potrebama i/ili ograničenim unosom ili ograničenim volumenom tekućine kod koje se normalnom prehranom i/ili peroralnim unosom ne mogu zadovoljiti ili nadoknaditi energetske i nutritivne potrebe, kao pripravak za enteralnu prehranu u liječenju Crohnove bolesti i kao potpora prehrani prije ili nakon operativnih zahvata ■ Preporuka za primjenu: specijalist pedijatar ■ Nalaz: / ■ Vremensko ograničenje preporuke: 6 mjeseci	■ Indikacija: za ugušćivanje tekućina i hrane u bolesnika s disfagijom ■ Preporuka za primjenu: bolnički specijalist ■ Nalaz: obavezno jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom enteralne nutritivne potpore ■ Nastavak primjene: bolnički specijalist svakih 6 mjeseci	
Razlozi za primjenu enteralne prehrane^{1,2}	■ Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 5% u mjesec dana ■ Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 10% u tri mjeseca ■ NRS 2002 ≥ 3 ■ BMI < 20,5 ■ Zbog bolesti se ne mogu normalnim putem zadovoljiti energetske i nutritivne potrebe	Tumorska kaheksija uz: ■ Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 5% u mjesec dana ■ Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 10% u tri mjeseca ■ NRS 2002 ≥ 3 ■ BMI < 20,5 ■ Zbog bolesti se ne mogu normalnim putem zadovoljiti energetske i nutritivne potrebe	Pokretni bolesnici: ■ SARC-F ≥ 4 ■ SPPB test 0-9 Nepokretni bolesnici: ■ Gubitak mase, snage i funkcije mišića		■ Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 5% u mjesec dana ■ Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 10% u tri mjeseca ■ NRS 2002 ≥ 3 ■ BMI < 20,5 ■ Zbog bolesti se ne mogu normalnim putem zadovoljiti energetske i nutritivne potrebe			■ Disfagija ■ Poremećaj gutanja ■ Rizik od aspiracije
Okusi	■ Cappuccino ■ Vanilija ■ Šumsko voće	■ Cappuccino ■ Čokolada ■ Ananas-kokos ■ Tropsko voće	■ Vanilija-karamela ■ Lješnjak ■ Mango ■ Cappuccino	■ Limun-limeta ■ Jabuka ■ Naranča-ananas ■ Trešnja ■ Crni ribizl	■ Cappuccino ■ Vanilija	■ Banana ■ Jagoda	■ Čokolada ■ Vanilija	■ Neutralnog okusa
Pakiranje	200 ml	200 ml	125 ml	200 ml	200 ml	200 ml	200 ml	225 g
Doziranje PP*	1000 ml	≥ 1000 ml	500 - 625 ml	Nije pogodan za potpunu prehranu	1000 ml	600 ml - 1600 ml	600 ml - 1600 ml	
Doziranje NP**	400 ml - 600 ml	400 ml	125 ml - 250 ml	Perioperativno hranjenje bolesnika 400 ml večer uoči operacije, te 200 ml do 2 sata prije početka anestezije. Ostale indikacije - ovisno o energetskim potrebama	≥ 200 ml	200 ml - 600 ml	200 ml - 600 ml	
Napomena	Nije pogodno za djecu mlađu od 3 godine. Primjenjivati oprezno kod djece mlađe od 6 godina.	Nije pogodno za djecu mlađu od 3 godine. Primjenjivati oprezno kod djece mlađe od 6 godina.	Nije pogodno za djecu mlađu od 3 godine. Primjenjivati oprezno kod djece mlađe od 6 godina.	Nije pogodno za djecu mlađu od 3 godine. Primjenjivati oprezno kod djece mlađe od 6 godina.	Nije pogodno za djecu mlađu od 3 godine. Primjenjivati oprezno kod djece mlađe od 6 godina.	Nije pogodno za djecu mlađu od jedne godine.	Nije pogodno za djecu mlađu od jedne godine.	Nije pogodno za djecu mlađu od 3 godine.
	NA OSNOVNOJ LISTI HZZO-a			NA OSNOVNOJ LISTI HZZO-a		NA OSNOVNOJ LISTI HZZO-a		NA DOPUNSKOJ LISTI LIJEKOVA

* Potpuna prehrana
** Nadopuna prehrani



	STANDARDNI PRIPRAVCI			BOLEST SPECIFIČNI PRIPRAVCI						
	 750 kcal 1,5 kcal/ml 37,5g Proteina Fresubin HP ENERGY 1,5 kcal/ml	 1000 kcal 2,0 kcal/ml 50g Proteina Fresubin 2 KCAL HP 2 kcal/ml	 1000 kcal 2,0 kcal/ml 50g Proteina Fresubin 2 KCAL HP FIBRE 2 kcal/ml	 750 kcal 1,5 kcal/ml 50g Proteina Supportan Onkologija	 250 kcal 0,5 kcal/ml 42,5g Proteina Intestamin Kritično oboljeli	 500 kcal 1,0 kcal/ml 27,5g Proteina Reconvan Kritično oboljeli	 500 kcal 1,0 kcal/ml 22,5g Proteina Survimed OPD Kritično oboljeli	 525 kcal 1,05 kcal/ml 22,5g Protein Diben Dijabetes		
Karakteristike	<ul style="list-style-type: none"> Visokokalorijski Visokoproteinski Sadrži MCT Sadrži riblje ulje Ne sadrži vlakna 	<ul style="list-style-type: none"> Visokokalorijski Visokoproteinski Sadrži MCT Visok udio MUFA Sadrži riblje ulje Ne sadrži vlakna 	<ul style="list-style-type: none"> Visokokalorijski Visokoproteinski Sadrži MCT Visok udio MUFA Sadrži riblje ulje Sadrži vlakna 	<ul style="list-style-type: none"> Visokokalorijski Visokoproteinski Bogat EPA-om iz ribljeg ulja Visok udio masti Nizak udio ugljikohidrata Sadrži MCT Sadrži vlakna 	<ul style="list-style-type: none"> Visok udio glutamina u obliku dipeptida (30g/RDD) Visok udio antioksidansa; vit. C i E, Beta karoten, Zn i Se Sadrži tributirin Ograničen dnevni volumen Ne sadrži vlakna 	<ul style="list-style-type: none"> Izokalorijski Visokoproteinski Visok udio glutamina (15 g/RDD) Visok udio arginina (10 g/RDD) Visok udio EPA i DHA iz ribljeg ulja (omega3/omega 6 omjer 1:2) Sadrži MCT Ne sadrži vlakna 	<ul style="list-style-type: none"> Izokalorijski Sadrži hidrolizirane proteine (peptide) sirutke Sadrži MCT Sadrži riblje ulje Ne sadrži vlakna 	<ul style="list-style-type: none"> Izokalorijski Visok udio MUFA Sadrži riblje ulje Nizak glikemijski indeks Visok udio antioksidansa (vit. E i beta-karoten) i magnezija Sadrži vlakna Sadrži ekstrakt zelenog čaja 		
Smjernica¹	<ul style="list-style-type: none"> Indikacija: liječenje bolesnika s pothranjenošću Preporuka za primjenu: bolnički specijalist Nalaz: obavezno navesti tjelesnu težinu bolesnika i jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom enteralne nutritivne potpore Nastavak primjene: izabrani doktor medicine svaka 3 mjeseca Isključivo za primjenu putem enteralne sonde 			<ul style="list-style-type: none"> Indikacija: liječenje onkoloških bolesnika s tumorskom kaheksijom Preporuka za primjenu: bolnički specijalist koji sudjeluje u onkološkom liječenju Nalaz: obavezno navesti tjelesnu težinu bolesnika i jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom enteralne nutritivne potpore Nastavak primjene: bolnički specijalist svakih 6 mjeseci Isključivo za primjenu putem enteralne sonde 		<ul style="list-style-type: none"> Indikacija: liječenje bolesnika u kritičnom stanju s ograničenom tolerancijom enteralnog volumena i velikom potrebom za glutaminom i antioksidansima Preporuka za primjenu: bolnički specijalist Nalaz: obavezno navesti tjelesnu težinu bolesnika i jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom enteralne nutritivne potpore Nastavak primjene: bolnički specijalist svaka 3 mjeseca Isključivo za primjenu putem enteralne sonde 		<ul style="list-style-type: none"> Indikacija: za prehranu bolesnika s povećanim rizikom od infekcija u postoperativnim i posttraumatskim stanjima Preporuka za primjenu: bolnički specijalist Nalaz: obavezno navesti tjelesnu težinu bolesnika i jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom enteralne nutritivne potpore Nastavak primjene: bolnički specijalist svaka 3 mjeseca Isključivo za primjenu putem enteralne sonde 		<ul style="list-style-type: none"> Indikacija: liječenje bolesnika s malapsorpcijskim sindromom, teškim oblicima Crohnove bolesti, sindromom kratkog crijeva, teškom insuficijencijom funkcije gušterače i jetre, enteropatijama te svim oblicima zatajenja crijevne funkcije Preporuka za primjenu: bolnički specijalist Nalaz: obavezno navesti tjelesnu težinu bolesnika i jasno utvrditi medicinske razloge zbog kojih postoji potreba za ovom vrstom enteralne nutritivne potpore Nastavak primjene: bolnički specijalist svakih 6 mjeseci Isključivo za primjenu putem enteralne sonde
Razlozi za primjenu enteralne prehrane^{1,2}	<ul style="list-style-type: none"> Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 5% u mjesec dana Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 10% u tri mjeseca NRS 2002 ≥ 3 BMI < 20,5 Zbog bolesti se ne mogu normalnim putem zadovoljiti energetske i nutritivne potrebe 			<ul style="list-style-type: none"> Tumorska kaheksija uz: Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 5% u mjesec dana Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 10% u tri mjeseca NRS 2002 ≥ 3 BMI < 20,5 Zbog bolesti se ne mogu normalnim putem zadovoljiti energetske i nutritivne potrebe 		<ul style="list-style-type: none"> Bolesnik u kritičnom stanju s ograničenom tolerancijom enteralnog volumena i velikom potrebom za glutaminom i antioksidansima 		<ul style="list-style-type: none"> Povećani rizik od infekcija u postoperativnom stanju Povećani rizik od infekcija u posttraumatskom stanju 		<ul style="list-style-type: none"> Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 5% u mjesec dana Nenamjerni gubitak tjelesne težine veći od 10% u tri mjeseca NRS 2002 ≥ 3 BMI < 20,5 Zbog bolesti se ne mogu normalnim putem zadovoljiti energetske i nutritivne potrebe
Okusi	Bez laktoze i glutena	Bez laktoze i glutena		Bez laktoze i glutena	Bez laktoze i glutena			Bez laktoze i glutena		
	Bez okusa	Bez okusa		Bez okusa	Bez okusa			Bez okusa		
Pakiranje	500 ml	500 ml		500 ml	500 ml			500 ml		
Doziranje PP*	Najmanje 1500 ml	Najmanje 1000 ml		≥ 1000 ml	Nije pogodan za potpunu prehranu			Najmanje 1500 ml		
Doziranje NP**	Najmanje 500 ml	250 ml - 500 ml		≥ 500 ml	500 ml			Najmanje 500 ml		
Napomena	Nije pogodno za djecu mlađu od 3 godine. Primjenjivati oprezno kod djece mlađe od 6 godina.	Nije pogodno za djecu mlađu od 3 godine. Primjenjivati oprezno kod djece mlađe od 6 godina.		Nije pogodno za djecu mlađu od 3 godine. Primjenjivati oprezno kod djece mlađe od 6 godina.	Nije pogodno za djecu mlađu od 10 godina.			Nije pogodno za djecu mlađu od 3 godine. Primjenjivati oprezno kod djece mlađe od 6 godina.		
	NA OSNOVNOJ LISTI HZZO-a			NA OSNOVNOJ LISTI HZZO-a		NA DOPUNSKOJ LISTI LIJEKOVA		NA OSNOVNOJ LISTI HZZO-a		

*Potpuna prehrana
**Nadopuna prehrani

<p style="text-align: center;">Amika Pump</p> 	<p style="text-align: center;">Amika Pump Set EasyBag, ENFit universal</p> 	<p style="text-align: center;">Freka Connect (20 ml, 60 ml) ENFit</p> 	<p style="text-align: center;">Amika Pump Set Bag, ENFit universal</p> 
<p style="text-align: center;">Kataloški broj: Z044190 HZZO šifra: 091812092905</p>	<p style="text-align: center;">Kataloški broj: 7751907 HZZO šifra: 091812093204</p>	<p style="text-align: center;">Kataloški broj: (20 ml) 900785S, (60 ml) 9000786S HZZO šifra: (20 ml) 041909093302, (60 ml) 041909093502</p>	<p style="text-align: center;">Kataloški broj: 7751908 HZZO šifra: 091812093105</p>
<p>Opis proizvoda: Prijenosna pumpa za enteralno hranjenje.</p>	<p>Opis proizvoda: Sistem za pumpu za enteralno hranjenje Amika Pump Set EasyBag kompatibilan sa pripravicima za enteralnu prehranu u plastičnim vrećicama.</p>	<p>Opis proizvoda: Plastične štrcaljke za enteralnu prehranu putem sonde.</p>	<p>Opis proizvoda: Sistem sa vrećicom za enteralno hranjenje pumpom Amika.</p>
<p style="text-align: center;">Applix GraviSet EasyBag, ENFit universal</p>	<p style="text-align: center;">Applix GraviSet Bag, ENFit universal</p>	<p style="text-align: center;">Freka Tube Ch 8 (60 cm, 80 cm, 120 cm)</p>	
			
<p style="text-align: center;">Kataloški broj: 7751952 HZZO šifra: 091812093702</p>	<p style="text-align: center;">Kataloški broj: 7751954 HZZO šifra: 091812093602</p>	<p style="text-align: center;">Kataloški broj: (60 cm) 7981101, (80 cm) 7840051, (120 cm) 7981691 HZZO šifra: 091812094302</p>	
<p>Opis proizvoda: Gravitacijski sistem za enteralno hranjenje kompatibilan s pripravicima za enteralnu prehranu u plastičnim vrećicama.</p>	<p>Opis proizvoda: Gravitacijski sistem za enteralno hranjenje s vrećicom.</p>	<p>Opis proizvoda: Dječja poliuretanska sonda različitih dužina.</p>	

